


### Анаболните стероиди имат широко приложение в медицината:

- Като хормонозаместваща терапия;
- Като средство за предотвратяване загубата на мускулна и костна маса при химиотерапии и тежки изгаряния или оперативни намеси;
- Като лекарствени средства срещу анемии;
- Като средство за предизвикване на обратима лекарствена стерилност;
- При болни от СПИН.

Масовото им използване не е свързано с предотвратяването и борбата със здравословни проблеми, а с повишаването на спортни резултати, придобиването на различен външен вид, а в следствие - и с предизвикването на здравословни проблеми и зависимост.

## АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ

ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА В СПОРТА



ОБЩНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА-ВИДИН


### Анаболните стероиди имат широко приложение в медицината:

- Като хормонозаместваща терапия;
- Като средство за предотвратяване загубата на мускулна и костна маса при химиотерапии и тежки изгаряния или оперативни намеси;
- Като лекарствени средства срещу анемии;
- Като средство за предизвикване на обратима лекарствена стерилност;
- При болни от СПИН.

Масовото им използване не е свързано с предотвратяването и борбата със здравословни проблеми, а с повишаването на спортни резултати, придобиването на различен външен вид, а в следствие - и с предизвикването на здравословни проблеми и зависимост.

## АНАБОЛНИ СТЕРОИДИ

ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА В СПОРТА



ОБЩНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА-ВИДИН


### Странични ефекти при двата пола:

- Преждевременно калциране на костите;
- Възпаление и нараняване на сухожилията;
- Засилено агресивно поведение;
- Повишено кръвно налягане;
- Повишено съсирване на кръвта;
- Повишени чернодробни показатели;
- Акне, обриви, омазняване на кожата;
- Висок холестерол;
- Косопад;
- Жълтеница;
- Депресия, след прекратяване на употребата и други.




### Странични ефекти при двата пола:

- Преждевременно калциране на костите;
- Възпаление и нараняване на сухожилията;
- Засилено агресивно поведение;
- Повишено кръвно налягане;
- Повишено съсирване на кръвта;
- Повишени чернодробни показатели;
- Акне, обриви, омазняване на кожата;
- Висок холестерол;
- Косопад;
- Жълтеница;
- Депресия, след прекратяване на употребата и други.



### Рискове само при мъже:

- Отслабване на либидото;
- Развиване на млечните жлези и силна болка в областта на зърното;
- Болезнена ерекция;
- Смаляване на тестисите (спират производството на тестостерон);
- Увеличаване на простатата (рак).



### Рискове само при мъже:

- Отслабване на либидото;
- Развиване на млечните жлези и силна болка в областта на зърното;
- Болезнена ерекция;
- Смаляване на тестисите (спират производството на тестостерон);
- Увеличаване на простатата (рак).

### Рискове само при жени:

- Загрубяване на гласа;
- Менструални смущения;
- Смаляване на гърдите;
- Повишено окосмяване;
- Увреждане на зародиша.



### Рискове само при жени:

- Загрубяване на гласа;
- Менструални смущения;
- Смаляване на гърдите;
- Повишено окосмяване;
- Увреждане на зародиша.



адрес: пл. Бдинци 2, ет. 13, ст. 4, 9 и 11;  
тел.: 094 600 775; 094 600 930;  
e-mail: osnv.vd@gmail.com;



адрес: пл. Бдинци 2, ет. 13, ст. 4, 9 и 11;  
тел.: 094 600 775; 094 600 930;  
e-mail: osnv.vd@gmail.com;